

DOUBLE BLIND STUDY...

Kočky



Pilotní studie u koček



BESAME - pilotní studie

- **Psi a kočky postižené onemocněním jater**
 - Cholangitis / Cholangiohepatitis (kočky)
 - Akutní hepatitida (psi)
- **10 pacientů pro každý druh léčených a sledovaných po dobu 90 dnů**
- **Dobrá klinická praxe**
- **Diagnostika založená na klinice, US, cytologii a hematologii**
- **Kompletní klinické hodnocení, hematologie a urinoanalýza byly provedeny v T0, T15, T30, T60, T90**
- **Další terapie**
 - Jaterní dieta
 - Antibiotika (pokud je požadována)
 - Tekutiny (pokud je požadována)
- **Kontrolní skupiny (pouze doplňková terapie)**
- **Žádné nežádoucí účinky**
- **Dobré přijímaní pacienty**




Oxidační stres


D-ROM m.v.
Cats (<92 UCARR)
Reaktivní sloučeniny metabolitů kyslíku




BAP m.v.
Cats (> 2550 mmol/lit)
Biological Antioxidant Potential




Transaminázy







Bilirubin



AST m.v. Cani (7-40 UI/lit)





Hepatoprotektivní a antioxidační funkce fermentovaného methioninu a Silybum marianum u koček se zánětlivým onemocněním jater

Tiziana Cocca¹, Elena Biasibetti², Mauro Bigliati³, Silvia Mioletti²,
Maria Teresa Capucchio², Natascia Brunì³



¹Clinica Veterinaria Napolivet, Napoli, Italia

²Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Italia

³Istituto Farmaceutico Candioli S.p.A., Beinasco (TO), Italia

Výsledky prezentovány na



SISVet

LXXI Convegno Nazionale SISVet

Neapol, 28. června - 1 července 2017

Na závěr



- 2 různé složky pracují synergicky
 - proti oxidačnímu stresu
 - na ochraně jaterních buněk
- Potvrdil, že je bezpečný a účinný jak u psů, tak u koček postižených onemocněním jater.
- Snadná aplikace: tablety mohou být rozděleny a smíchány s krmivem nebo přímo podávány do úst.
- Dobrá chuťnost.